UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE
MADRID

instituto
imdea
nanociencia

Grupo de LÁMINAS DELGADAS, SUPERCONDUCTIVIDAD y TRANSPORTE CUÁNTICO

Álvaro Muñoz Noval
Departamento de Física de Materiales
Facultad de Ciencias Físicas
Universidad Complutense de Madrid

SUPERCONDUCTIVIDAD

MAGNETISMO

MATERIALES 2D

UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE
MADRID

instituto
imdea
nanociencia

INSTALACIONES e INSTRUMENTOS

LABORATORIO DE FABRICACIÓN DE LÁMINAS DELGADAS Y MATERIALES MAGNÉTICOS

UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE
MADRID

Criostato de ciclo cerrado, MFM, Unidad de Cálculo y simulaciones...

SALA BLANCA

UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE
MADRID

EQUIPOS DE MEDIDA A BAJA TEMPERATURA

instituto
imdea
nanociencia

www.nanociencia.imdea.org

UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE
MADRID

FABRICACIÓN DE DISPOSITIVOS 2D

PURIFICADOR Y LICUEFACTORES DE HELIO

instituto
imdea
nanociencia

www.nanociencia.imdea.org

SERVICIO DE NANOFABRICACIÓN

instituto
imdea
nanociencia

www.nanociencia.imdea.org

UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE
MADRID

PERSONAL

José Luis Vicent

Elvira M. González

Mariela Menghini

Álvaro Muñoz Noval

instituto
imdea
nanociencia

Former members and collaborators:

Víctor Rollano, Ph.D.
Fernando Gálvez, Ph.D.
Javier del Valle, Ph.D.
Luis Ruiz, Ph.D.
Alicia Gómez, Ph.D.

Ana Parente
PhD. student

Nacho Figueruelo
PhD. student

**Eugenia
Sebastiani**
Master student

Gabriel Caballero
Master student

UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE
MADRID

instituto
imdea
nanociencia

LINEAS DE INVESTIGACIÓN

UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE
MADRID

instituto
iMdea
nanociencia

Interacción superconductor/magnético: sistemas tipo Spin ice

Superconductores tipo II

Vórtices

H. F. Hess *et al.*, *Phys. Rev. Lett.* **62**, 214 (1989)

RED DE ABRIKOSOV

$$a = 1.075 \left(\frac{\Phi_0}{B} \right)^{1/2}$$

Estructura de un vórtice

DINÁMICA DE VÓRTICES

¿Qué ocurre al aplicar corriente?

Vórtices en movimiento disipan energía

Resistencia $\neq 0$

EFFECTO DE CONMENSURABILIDAD

EFEECTO DE CONMENSURABILIDAD

EFEECTO DE CONMENSURABILIDAD

$$\text{Densidad de vórtices} = n \cdot \text{Densidad de centros de anclaje}$$

CAMPOS
DE
MATCHING

$$H_n = n \cdot H_1 = n \cdot \frac{\Phi_0}{S}$$

RESISTENCIA
DISMINUYE ÓRDENES
DE MAGNITUD

EFFECTO DE CONMENSURABILIDAD

S. Raedts *et al. Phys. Rev B* **70**, 024509 (2004)

HUECOS O AGUJEROS

J. del Valle *et al. Appl. Phys. Lett.* **109**, 172601 (2016)

NANOESTRUCTURAS METÁLICAS (Cu, Ag,...)

A. Gomez *et al. Appl. Phys. Lett.* **102**, 052601 (2013)

NANOESTRUCTURAS MAGNÉTICAS (Ni, Py, Co/Pd...)

GEOMÉTRICO

NO SE PUEDE MODIFICAR

MAGNÉTICO

SE PUEDE MODIFICAR

Interacción entre un SC y una estructura magnética tipo Spin Ice

Mumax³ simulation

SISTEMA MAGNÉTICO FRUSTRADO

ICE II ESTADO ORDENADO
ORDEN DE LARGO ALCANCE

ICE I ESTADO DESORDENADO

Universidad de Oviedo

Nb 100 nm

INTERACCIÓN CON SUPERCONDUCTOR TIPO II

CAMPOS DE MATCHING

$$B_n = n \frac{\Phi_0}{S}$$

MÍNIMOS EN MAGNETORRESISTENCIA

UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE
MADRID

instituto
iMdea
nanociencia

Interacción entre superconductores nanoestructurados

RED CUADRADA
700 nm x 700 nm

CAMPO DE MATCHING
ESPERADO
 $H_1 = 40 \text{ Oe}$

Medida SQUID

INCREMENTO LOCAL DE LA
TEMPERATURA CRÍTICA

POTENCIALES DE ANTIPINNING CREADOS POR NANOESTRUCTURAS SUPERCONDUCTORAS

EFFECTO DE CONMENSURABILIDAD ANÓMALO

$J_c(\text{VCu}) > J_c(\text{VNb})$

**Añadir vórtices
(aumentar el campo)
≠
Retirar vórtices
(disminuir el campo)**

MECANISMOS DE ANTIPINNING

AUMENTO LOCAL DE LA TEMPERATURA CRÍTICA

AUMENTO LOCAL DEL ESPESOR

VÓRTICES EXPULSADOS A LAS ZONAS DE MENOR T_c Y MENOR ESPESOR

UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE
MADRID

instituto
imdea
nanociencia

¡Muchas gracias por vuestra atención!